

Imunoglobulina Endovenosa no Serviço de Medicina I HOSPITAL FERNANDO FONSECA, EPE

Neves M.¹, Martins H.², Elias C.³, Mascarenhas Araújo J.⁴

¹Interna do Ano Comum do Serviço de Medicina I, ²Interno de Medicina Interna do Serviço de Medicina I, ³Farmacêutica dos Serviços Farmacêuticos, ⁴Director do Serviço de Medicina I

Objectivos:

Rever a utilização de IgIV no Serviço de Medicina I, com atenção para as indicações clínicas, efeito terapêutico e eventuais reacções adversas.

Resultados:

- 8 doentes do Serviço de Medicina I (10% dos pedidos):
- 7 processos consultados:
 - Idade média 50 anos
 - Sexo masculino 57% (4)

Metodologia:

- Estudo retrospectivo
- Consulta das requisições de IgIV na farmácia hospitalar referentes ao ano de 2008;
- Consulta dos processos clínicos dos doentes do Serviço de Medicina I que receberam IgIV em 2008.




Gráfico 1: Diagnósticos dos doentes que fizeram IgIV no Serviço de Medicina I em 2008

Diagnósticos	Efeito terapêutico	Reacções adversas
Imunodeficiência Comum Variável	Ciclos de IgIV <i>ad vitae</i>	1 Síndrome Febril
Trombocitopénia de causa desconhecida	Resposta transitória	1 Reacção eritematosa
Anemia Hemolítica Auto-imune	Sem resposta	--
Aplasia Medular	Sem resposta	--

Conclusões:

- Efeito terapêutico em 5 casos (variável duração do efeito);
- Efeitos adversos pouco graves;
- Insucesso terapêutico em anemia hemolítica auto-imune (inesperado) e em aplasia medular.

Bibliografia:

- Provan D, *et al*, Clinical Guidelines for Immunoglobulin Use, 2ª edição, 2008, DH